

2015 年成人高等学校招生全国统一考试高起点

数 学

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。满分 150 分。考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	总 分	统分人签字
分 数					

第 I 卷(选择题,共 85 分)

得 分	评卷人

一、选择题(本大题共 17 小题,每小题 5 分,共 85 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 甲、乙两人独立地破译一个密码,设两人能破译的概率分别为 p_1, p_2 , 则恰有一人能破译的概率为
 A. $1 - (1 - p_1)(1 - p_2)$ B. $p_1 p_2$
 C. $(1 - p_1)p_2$ D. $(1 - p_1)p_2 + (1 - p_2)p_1$ 【 】
2. 若 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, $\sin \theta = \frac{1}{4}$, 则 $\cos \theta =$
 A. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ B. $-\frac{\sqrt{15}}{4}$
 C. $-\frac{\sqrt{15}}{16}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{16}$ 【 】
3. 已知平面向量 $a = (-2, 1)$ 与 $b = (\lambda, 2)$ 垂直, 则 $\lambda =$
 A. 4 B. -4
 C. -1 D. 1 【 】
4. 设集合 $M = \{2, 5, 8\}$, $N = \{6, 8\}$, 则 $M \cup N =$
 A. $\{2, 5, 6\}$ B. $\{8\}$
 C. $\{6\}$ D. $\{2, 5, 6, 8\}$ 【 】
5. 函数 $y = \sqrt{x^2 + 9}$ 的值域为
 A. $\mathbf{R}$ B. $[3, +\infty)$
 C. $[0, +\infty)$ D. $[9, +\infty)$ 【 】
6. 设函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像经过点 $(2, -2)$, 则 $k =$
 A. -4 B. 4
 C. 1 D. -1 【 】

7. 若等比数列
- $\{a_n\}$
- 的公比为 3,
- $a_4 = 9$
- , 则
- $a_1 =$
- 【 】

A. 27

B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{3}$

D. 3

8. 下列函数在各自定义域中为增函数的是 【 】

A. $y = 1 + 2^x$ B. $y = 1 - x$ C. $y = 1 + x^2$ D. $y = 1 + 2^{-x}$

9. 设甲: 函数
- $y = kx + b$
- 的图像过点
- $(1, 1)$
- , 【 】

乙: $k + b = 1$,

则

A. 甲是乙的充分必要条件

B. 甲是乙的必要条件, 但不是乙的充分条件

C. 甲是乙的充分条件, 但不是乙的必要条件

D. 甲不是乙的充分条件, 也不是乙的必要条件

10. 已知点
- $A(1, 1), B(2, 1), C(-2, 3)$
- , 则过点 A 及线段 BC 中点的直线方程为 【 】

A. $x - y + 2 = 0$ B. $x + y - 2 = 0$ C. $x + y + 2 = 0$ D. $x - y = 0$

11. 设二次函数
- $y = ax^2 + bx + c$
- 的图像过点
- $(-1, 2)$
- 和
- $(3, 2)$
- , 则其对称轴的方程为 【 】

A. $x = -1$ B. $x = 3$ C. $x = 2$ D. $x = 1$

- 12.
- $\log_5 10 - \log_5 2 =$
- 【 】

A. 8

B. 0

C. 1

D. 5

13. 设
- $\tan \theta = 2$
- , 则
- $\tan(\theta + \pi) =$
- 【 】

A. -2

B. 2

C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

14. 下列不等式成立的是 【 】

A. $\log_2 5 > \log_2 3$ B. $\left(\frac{1}{2}\right)^5 > \left(\frac{1}{2}\right)^3$ C. $5^{-\frac{1}{2}} > 3^{-\frac{1}{2}}$ D. $\log_{\frac{1}{2}} 5 > \log_{\frac{1}{2}} 3$

15. 某学校为新生开设了 4 门选修课程, 规定每位新生至少要选其中 3 门, 则一位新生不同的选课方案共有 【 】

A. 7 种

B. 4 种

C. 5 种

D. 6 种

16. 以点
- $(0, 1)$
- 为圆心且与直线
- $\sqrt{3}x - y - 3 = 0$
- 相切的圆的方程为 【 】

A. $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ B. $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ C. $x^2 + (y - 1)^2 = 4$ D. $x^2 + (y - 1)^2 = 16$

17. 设 $f(x)$ 为偶函数, 若 $f(-2) = 3$, 则 $f(2) =$

- A. 6
B. -3
C. 0
D. 3

第 II 卷 (非选择题, 共 65 分)

得 分	评卷人

二、填空题 (本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

18. 不等式 $|x - 1| < 1$ 的解集为_____.

19. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线过双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的左焦点, 则 $p =$ _____.

20. 曲线 $y = x^2 + 3x + 4$ 在点 $(-1, 2)$ 处的切线方程为_____.

21. 从某公司生产的安全带中随机抽取 10 条进行断力测试, 测试结果 (单位: kg) 如下:

3722 3872 4004 4012 3972 3778 4022 4006 3986 4026

则该样本的样本方差为_____ kg^2 (精确到 0.1).

得 分	评卷人

三、解答题 (本大题共 4 小题, 共 49 分. 解答应写出推理、演算步骤)

22. (本小题满分 12 分)

已知 $\triangle ABC$ 中, $A = 30^\circ$, $AC = BC = 1$. 求

- (I) AB ;
(II) $\triangle ABC$ 的面积.

【 】

23. (本小题满分 12 分)

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$, $a_1 = \frac{1}{2}$, 且 a_1, a_2, a_5 成等比数列.

- (I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(II) 若 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 50$, 求 n .

24. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 在 $x = 1$ 处取得极值 -1, 求

- (I) a, b ;
(II) $f(x)$ 的单调区间, 并指出 $f(x)$ 在各个单调区间的单调性.

25. (本小题满分 13 分)

设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2 , 直线 l 过 F_1 且斜率为 $\frac{3}{4}$,

$A(x_0, y_0) (y_0 > 0)$ 为 l 和 E 的交点, $AF_2 \perp F_1F_2$.

(I) 求 E 的离心率;

(II) 若 E 的焦距为 2, 求其方程.

参考答案及解析

一、选择题

1. 【答案】 D

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为相互独立事件.

【应试指导】 设事件 A 为甲破译密码, 事件 B 为乙破译密码, 且 A 与 B 相互独立, 则事件 $\overline{AB} + \overline{AB}$ 为恰有一人能破译密码, $P(\overline{AB} + \overline{AB}) = P(\overline{AB}) + P(\overline{AB}) = P(A)P(\overline{B}) + P(\overline{A})P(B) = p_1(1 - p_2) + p_2(1 - p_1)$.

2. 【答案】 B

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为三角函数式的变换.

【应试指导】 因为 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, 所以 $\cos \theta < 0$, $\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\sqrt{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2} = -\frac{\sqrt{15}}{4}$.

3. 【答案】 D

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为向量的数量积的性质.

【应试指导】 因为 a 与 b 垂直, 所以 $a \cdot b = -2\lambda + 2 = 0$, $\lambda = 1$.

4. 【答案】 D

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为集合之间的运算.

【应试指导】 $M \cup N = \{2, 5, 8\} \cup \{6, 8\} = \{2, 5, 6, 8\}$.

5. 【答案】 B

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为函数的值域.

【应试指导】 因为对任意的 x 都有 $x^2 + 9 \geq 9$, 即 $y = \sqrt{x^2 + 9} \geq \sqrt{9} = 3$, 则函数 $y = \sqrt{x^2 + 9}$ 的值域为 $[3, +\infty)$.

6. 【答案】 A

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为函数图像的性质.

【应试指导】 因为函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像经过点 $(2, -2)$, 所以, $-2 = \frac{k}{2}$, $k = -4$.

7. 【答案】 C

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为等比数列.

【应试指导】 由题意知, $q = 3$, $a_4 = a_1 q^3$, 即 $3^3 a_1 = 9$, $a_1 = \frac{1}{3}$.

8. 【答案】 A

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为增函数.

【应试指导】 由指数函数图像的性质可知, A 项是增函数.

9. 【答案】 A

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为简易逻辑.

【应试指导】 函数 $y = kx + b$ 的图像过点 $(1, 1) \Rightarrow k + b = 1$; $k + b = 1$, 当 $x = 1$ 时, $y = k + b = 1$, 即函数 $y = kx + b$ 的图像过 $(1, 1)$ 点, 故甲是乙的充分必要条件.

10. 【答案】 B

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为直线方程的两点式.

【应试指导】 线段 BC 的中点坐标为 $\left(\frac{-2+2}{2}, \frac{1+3}{2}\right)$, 即 $(0, 2)$, 则过 $(1, 1)$, $(0, 2)$ 点的直线方程为 $\frac{y-1}{2-1} =$

$\frac{x-1}{0-1} \Rightarrow x + y - 2 = 0$.

11. 【答案】 D

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为二次函数的对称轴方程.

【应试指导】 由题意知, $\begin{cases} a - b + c = 2 \\ 9a + 3b + c = 2 \end{cases} \Rightarrow b = -2a$, 则二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的对称轴方程为

$x = -\frac{b}{2a} = 1$.

12.【答案】C

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为对数函数.

【应试指导】 $\log_5 10 - \log_5 2 = \log_5 \frac{10}{2} = 1$.

13.【答案】B

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为正切函数的变换.

【应试指导】 $\tan(\theta + \pi) = \tan \theta = 2$.

14.【答案】A

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为不等式的性质.

【应试指导】 由对数函数图像的性质可知A项正确.

15.【答案】C

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为组合数.

【应试指导】 由题意知,新生可选3门或4门选修课程,则不同的选法共有: $C_4^3 + 1 = 4 + 1 = 5$ (种).

16.【答案】C

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为圆的方程.

【应试指导】 由题意知, $R = \frac{|0-1-3|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = 2$, 则圆的方程为 $x + (y-1)^2 = 4$.

17.【答案】D

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为偶函数的性质.

【应试指导】 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(2) = f(-2) = 3$.

二、填空题

18.【答案】 $\{x | 0 < x < 2\}$

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为不等式的解集.

【应试指导】 $|x-1| < 1 \Rightarrow -1 < x-1 < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$, 故不等式 $|x-1| < 1$ 的解集为 $\{x | 0 < x < 2\}$.

19.【答案】4

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为圆锥曲线的性质.

【应试指导】 由题意知, $p > 0$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的左焦点为 $(-\sqrt{3+1}, 0)$,

即 $(-2, 0)$, 由题意知, $-\frac{p}{2} = -2, p = 4$.

20.【答案】 $y = x + 3$

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为切线方程.

【应试指导】 $y = x^2 + 3x + 4 \Rightarrow y' = 2x + 3, y'|_{x=-1} = 1$, 故曲线在点 $(-1, 2)$ 处的切线方程为 $y - 2 = x + 1$, 即 $y = x + 3$.

21.【答案】10928.8

【考情点拨】 本题主要考查的知识点为方差.

【应试指导】 $\bar{x} = \frac{3722 + 3872 + 4004 + 4012 + 3972 + 3778 + 4022 + 4006 + 3986 + 4026}{10} = 3940, s^2 = \frac{(3722-3940)^2 + (3872-3940)^2 + \dots + (4026-3940)^2}{10} = 10928.8$.

三、解答题

22.(I) 由已知得 $C = 120^\circ$,

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C} \\ &= \sqrt{1+1-2\cos 120^\circ} \\ &= \sqrt{3}. \end{aligned}$$

(II) 设 CD 为 AB 边上的高, 那么

$$CD = AC \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$\triangle ABC$ 的面积为

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot CD = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

$$23.(I) a_2 = \frac{1}{2} + d, a_5 = \frac{1}{2} + 4d,$$

$$\text{由已知得 } \left(\frac{1}{2} + d\right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 4d\right),$$

解得 $d = 0$ (舍去), 或 $d = 1$.

所以 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \frac{1}{2} + (n-1) \times 1 = n - \frac{1}{2}.$$

$$(II) S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n^2}{2}. \text{ 由已知得 } \frac{n^2}{2} = 50,$$

解得 $n = -10$ (舍去), 或 $n = 10$.

所以 $n = 10$.

24.(I) $f'(x) = 3x^2 + 2ax$. 由题设知

$$\begin{cases} 3 + 2a = 0, \\ 1 + a + b = -1, \end{cases}$$

$$\text{解得 } a = -\frac{3}{2}, b = -\frac{1}{2}.$$

$$(II) \text{ 由(I) 知 } f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}.$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3x.$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = 1$.

当 x 变化时, $f'(x), f(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

即 $f(x)$ 的单调区间为 $(-\infty, 0), (0, 1), (1, +\infty)$, 并且 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (1, +\infty)$ 上为增函数, 在 $(0, 1)$ 上为减函数.

$$25.(I) \text{ 由题设知 } \triangle AF_1F_2 \text{ 为直角三角形, 且 } \tan \angle AF_1F_2 = \frac{3}{4}.$$

$$\text{设焦距 } |F_1F_2| = 2c, \text{ 则 } |AF_2| = \frac{3}{2}c, |AF_1| = \frac{5}{2}c,$$

$$2a = |AF_1| + |AF_2| = 4c.$$

所以离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{c}{2c} = \frac{1}{2}.$$

(II) 若 $2c = 2$, 则 $c = 1$, 且 $a = 2$,

$$b^2 = a^2 - c^2 = 3,$$

$$\text{椭圆方程为 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$